

Vážení čtenáři, na stránkách Dermatologie pro praxi se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete na jeho konci. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Plenková dermatitida je:

- a) kožní choroba, která se již po zavedení jednorázových plen nevyskytuje
- b) se podle klinického obrazu dělí na 4 typy
- c) kontaktní iritativní dermatitida v oblasti plen
- d) se léčí výhradně antimykotiky

2 Nejčastějším původcem vulgárního impetiga je:

- a) *Proteus vulgaris*
- b) *Streptococcus pyogenes*
- c) *Staphylococcus aureus*
- d) *Streptococcus pyogenes* a *Staphylococcus aureus* současně

3 Rozšířená vulvoskopie je:

- a) endoskopická vyšetřovací metoda
- b) vyšetření zevních rodidel dermatoskopem
- c) vyšetření zevních rodidel kolposkopem
- d) vyšetření zevních rodidel kolposkopem po aplikaci 5% kyseliny octové

4 ISSVD klasifikace nemoci vulvy je založena na:

- a) klinickém nálezu
- b) kolposkopickém nálezu
- c) histologickém obrazu
- d) klinickém a histologickém nálezu

5 V terapii chronického pruritu se uplatňuje:

- a) jen podávání antihistaminik
- b) kombinace centrálně působících protisvědivých léků a lokálně působících léků s protizánětlivým účinkem
- c) hlavně psychoterapie
- d) hlavně lokálně působící protizánětlivé léky

6 Pruritus v klinickém obraze

- a) svědění je projevem renální insuficience asi u 20% pacientů
- b) u pacientů s cholestatickým pruritem nezabírají antagonisté opiátů
- c) aquagenní pruritus je typický pro morbus Hodgkin
- d) z dermatologických léků působí pruritus nejčastěji – retinoidy, chlorochin, 8-metoxypsoraleny

7 Botulotoxin typu A byl poprvé izolován:

- a) v roce 1897
- b) v roce 1910
- c) v roce 1978
- d) ve 20. letech 20. století

8 Nástup účinku botulotoxinu typu B oproti botulotoxinu typu A je:

- a) stejný
- b) oproti botulotoxinu typu A rychlejší
- c) oproti botulotoxinu typu A pomalejší
- d) botulotoxin typu B není účinný u kožních indikací

9 Dominantním etiologickým agens vulvovaginitidy (kolpitidy) mykotického původu je:

- a) *Cryptococcus neoformans*
- b) *Malassezia furfur*
- c) *Candida albicans*
- d) *Saccharomyces cerevisiae*

10 Laboratorní diagnostika dermatofytických infekcí je založena na:

- a) kultivačním průkazem
- b) mikroskopii kožních derivátů v louhovém preparátu
- c) stanovení specifických protilátek k dermatofytům
- d) stanovení specifické DNA dermatofytů pomocí PCR

11 K léčbě slizniční kandidózy se nehodí:

- a) topické formulace imidazolových antimykotik
- b) perorální flukonazol
- c) griseofulvin
- d) topické formulace polyenových antibiotik

12 Mezi širokospektrá antimykotika vhodná k léčbě kožních mykóz patří:

- a) Flukonazol
- b) Griseofulvin
- c) Terbinafin
- d) Bifonazol

Správné odpovědi: 1. b, c; 2. c; 3. d; 4. c; 5. b; 6. d; 7. d; 8. b; 9. c; 10. a, b; 11. c; 12. a, c, d