

Léčba aktinické keratózy

MUDr. Marie Selerová, Ph.D.

Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně

Kazuistické sdělení popisuje léčbu aktinických keratóz pomocí Aldara krému u 69letého muže.

Klíčová slova: aktinická keratóza, Aldara krém, klinická remise.

Treatment of actinic keratoses

A case report describes the treatment of actinic keratoses using Aldara cream in a 69-year-old man.

Key words: actinic keratosis, Aldara cream, clinical remission.

Dermatol. praxi 2010; 4(1): 38

Obrázek 1. Před léčbou



Obrázek 2. Po třech týdnech léčby



Obrázek 3. Tři týdny po ukončení léčby



Pacient: 69 let, muž. V rodinné anamnéze se kožní nádory ani dysplastické névy nevyskytovaly. Pacient prodělal běžná dětská onemocnění. Léčí se pro hypertenzi, hyperlipoproteinemii, dispenzarizován v kardiologické ambulanci. Pracoval jako projektant, častý pohyb venku, nyní důchodce.

- 2/2001 odeslán praktickým lékařem pro ložisko na levém nosním křídle a frontálně vlevo na kožní ambulanci Nový Jičín.
- 2/2001 – ložisko na levém nosním křídle a frontálně vlevo. Provedena excize ložisek na ORL ambulanci. Histologie: solidní basaliom nepřesahující hranice excize. Pacient zařazen do dispenzarizace
- 7/2003 – doporučena excize susp. basaliomu capitis reg. temp. 1. sin. a brachii 1. sin. Pacient se k excizi nedostavil v plánovaném termínu.
- 4/2004 – realizace excize. Histologie: v prokrájení zastiženo ložisko solidního basaliomu

kůže na paži, basaliom capitis reg. temporalis.

- 1/2005 – 3 dyskeratózy na čele, jedna dyskeratóza na pravé tváři.
- 10/2005 – na pravé tváři drobná nehojící se eroze, susp. basaliom. Doporučení: excize. Histologie: multicentrický basaliom nedosahující k okrajům.
- 11/06 – Mnohočetné dyskeratózy na temeni hlavy. Doporučení: Retin A crm. Interskapulárně a na špičce nosu susp. basalioma doporučena excize obou lézí na plastické chirurgii.
- 2. 1. 2007 – 7. 1. 2007 hospitalizace na oddělení plastické chirurgie Třinec. Provedena plastická operace útvaru na nose. Histologie: basalioma adnexálního typu nedosahující hranice excize. Provedena excize útvaru na zádech – histologie solidní basalioma nedosahující hranice excize.

- 8/2008 – mnohočetné aktinické keratózy na tváři vpravo dop: fotoprotekce, histologicky verifikován jeden útvar.
- 11/2008 – nasazena terapie Aldara crm. 3x týdně. Po třech týdnech aplikace reakce – aplikován přechodně Fucidin ung. po dobu jednoho týdne. Aplikace na týden přerušena.

Výsledek: 14. 1. 2009 ukončena léčba s velmi dobrým efektem. Klinická remise. Pacient zůstává v dispenzární péči, poslední kontrola červen 09 – trvá klinická remise onemocnění.

MUDr. Marie Selerová, Ph.D.

Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně
K Nemocnici 76, Nový Jičín
marie.selerova@nspnj.cz