

Vážení čtenáři, na stránkách Dermatologie pro praxi se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete na jeho konci. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 V léčbě bércevého vředu žilní etiologie má zásadní význam:

- a) eliminace žilní hypertenze (kompresivní terapie, chirurgická léčba)
- b) léčba medikamenty
- c) rehabilitace
- d) žádná z odpovědí není správná

2 V lokální terapii upřednostňujeme:

- a) masti, zejména s antibiotiky
- b) moderní krytí, např. s hydrokoloidy
- c) suché krytí
- d) všechny odpovědi jsou správné

3 Nejlepší prognózu má ulcerace vzniklá:

- a) traumaticky
- b) na podkladě insuficience povrchového žilního systému
- c) na podkladě diabetické angiopatie
- d) žádná z odpovědí není správná

4 Jakým mechanismem se podílí lactoferrin na léčbě akné:

- a) antioxidační účinek
- b) potlačení růstu kvasinek
- c) zpomalení růstu *Propionibacterium acnes*
- d) antimikrobiální účinek na *Staphylococcus aureus*

5 Acneon tablety působí na redukci:

- a) komedonů
- b) jizev
- c) pigmentových skvrn
- d) papulopustul

6 V těhotenství platí zásada:

- a) neléčit vůbec
- b) je možno užít všechny léky
- c) je vhodná jen lokální léčba
- d) je vhodné užít místní i celkovou léčbu povolenou v období gravidity

7 K léčbě lupénky v graviditě jsou vhodné:

- a) lokální kortikosteroidy
- b) Acitretin
- c) PUVA
- d) NB UVB

8 Nejvhodnější pro léčbu akné v těhotenství jsou:

- a) kyselina azelaová
- b) lokální erytromycin
- c) perorální izotretinoin
- d) perorální tetracyklin

9 Infadolan mast obsahuje:

- a) azulen a bisabolol
- b) skvalen
- c) Retinoli acetat a Ergocalciferolum
- d) clotrimazol

10 Oilatum Emollient obsahuje:

- a) Paraffinum perliquidum
- b) směs lipidoacidoesterů
- c) rafinovaný sójový olej
- d) azulen a bisabolol

11 V diferenciální diagnostice seboroické dermatitidy musíme pomýšlet na:

- a) psoriázu
- b) atopický ekzém
- c) dermatitis herpetiformis
- d) impetigo contagiosa

12 V lokální terapii seboroické dermatitidy lze užít:

- a) kortikoidy potentní
- b) kortikoidy méně potentní
- c) azolová antimykotika
- d) deriváty calcineurinu v režimu „Off label use“

Správné odpovědi: 1. a; 2. b; 3. a; 4. a, b; 5. a, c; 6. d; 7. a, d; 8. a, b; 9. c; 10. a; 11. a, b, d; 12. b, c, d