

Vážení čtenáři, předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 20 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Správné odpovědi na otázky jsou v souladu s informacemi v příslušných člancích. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Koho titulujeme jako zakladatele moderní transplantace vlasového porostu?

- a) dr. Suzuki
- b) dr. Cole
- c) dr. Orentreich
- d) dr. Gott

2 Jak se nazývá metoda transplantace, která využívá bezskalpelovou metodu odběru dárcovského místa?

- a) strip metoda
- b) FUE metoda
- c) stick and place metoda
- d) fengshui metoda

3 Od kterého roku se bezskalpelová metoda transplantace oficiálně uvádí jako léčebný zákrok?

- a) 1994
- b) 2007
- c) 1967
- d) 2000

4 Protilátky proti Borrelia burgdorferi sensu stricto detekujeme metodou:

- a) ELISA
- b) Westernblotting
- c) Nested-PCR
- d) Real-time PCR

5 Doxycyklin:

- a) je vhodné zapíjet iontovým nápojem
- b) patří do skupiny první volby při léčbě erythema migrans
- c) lze využít při léčbě lymfocytomu s negativní serologií an borrelie
- d) v dávce 2 × 100 mg 14 dní je indikován k profylaktické léčbě po infestaci klíštětem

6 Ceftriaxon:

- a) patří do skupiny první volby při léčbě erythema chronicum migrans
- b) vykazuje při i. v. podání signifikantně lepší účinnost v léčbě erythema chronicum migrans než cefuroxim axetil podaný per os
- c) není běžně indikován pro léčbu borreliového lymfocytomu
- d) není indikován v léčbě acrodermatitis chronica atrophicans

7 Které z následujících tvrzení je pravdivé:

- a) pemphigus erythematosus patří do skupiny ekzém – dermatitid
- b) pemphigus erythematosus je považován za mírnější lokalizovanou variantu pemphigus foliaceus
- c) základním klinickým projevem pemphigus erythematosus je puchýř vznikající suprabazálně
- d) vznik puchýře u pemphigus erythematosus je podmíněn akantolýzou

8 Do histologického obrazu pemphigus erythematosus patří:

- a) spongióza
- b) akantolýza ve stratum spinosum nebo stratum granulosum
- c) vakuolární degenerace buněk stratum basale
- d) epidermotropismus

9 Klinické důsledky porušené bariérové funkce způsobují:

- a) zvýšenou taktilní citlivost
- b) zvýšenou propustnost kožního povrchu pro zevně působící látky
- c) vývoj prekancerů a maligních tumorů
- d) zvýšenou suchost kožního povrchu

10 Hodnoty TEWL u porušené bariérové funkce jsou:

- a) nezměněné
- b) závislé na denní době
- c) zvýšené
- d) snížené

11 Doba trvání fyziologické regenerace porušené bariéry je:

- a) ve všech oblastech tělesného povrchu stejná
- b) nejdelší na dlaních a ploskách
- c) nejdelší na hýždích a břiše
- d) nejkratší na krku a obličeji

12 Na biochemické struktuře regenerované bariéry se uplatňují:

- a) ceramidy
- b) filagrin
- c) prostaglandin
- d) hyaluronan sodný

13 Dexpanthenol v terapeutických koncentracích působí:

- a) antisepticky
- b) epitelizačně
- c) hydratačně
- d) keratolyticky

14 Přípravek Oleokrém s dexpanthenolem 5 % (receptura č. 5) není vhodný:

- a) pro kojence a malé děti
- b) pro pacienty alergické na tuk z ovčí vlny (lanolin) nebo alkoholy tuku z ovčí vlny (lanalkol)
- c) pro pacienty alergické na parabeny
- d) každodenní péči o pokožku

15 Vyberte správná tvrzení:

- a) protizánětlivý účinek dexpanthenolu je srovnatelný s lokálními kortikosteroidy III. až IV. třídy
- b) dexpanthenol snižuje hydratační působení glycerolu
- c) mastné emoliens s dexpanthenolem, ureou a dimetikonem (receptura č. 4) je vhodný pro ošetření velmi suché pokožky
- d) neoaquasorbový krém je hydrofilní krémový základ (o/v) s kyselým pH 4,6–5,0

16 Radiofrekvenční ablace byla poprvé provedena v roce:

- a) 1995
- b) 2000
- c) 2005
- d) 2008

17 Vlastní zákrok na safeně na dolní končetině trvá většinou:

- a) 30 s
- b) 5 min
- c) 30 min
- d) 120 min

18 Mezi specifická lokální imunomodulancia používaná v léčbě molusek a veruk patří:

- a) acidum salicylicum
- b) podofylotoxin
- c) imiquimod
- d) 5-fluorouracil

19 V terapii molusek se používá:

- a) 5% roztok hydroxidu draselného
- b) 50% roztok kyseliny monochloroctové
- c) 0,5% podofylotoxinový krém
- d) 5% krém s tretinoinem

20 V léčbě veruk má své místo:

- a) tekutý kyslík o teplotě -196 °C
- b) 0,5% roztok 5-fluorouracilu
- c) 0,15% podofylotoxinový krém
- d) 2% salicylový líh

Správně odpovědi: 1. c; 2. b; 3. d; 4. a, b; 5. b, c; 6. c; 7. b, d; 8. b, c; 9. a, b, d; 10. c; 11. d; 12. a, b, d; 13. b, c; 14. b; 15. c, d; 16. b; 17. b; 18. c; 19. a, c; 20. b, c