

Vážení čtenáři, na stránkách Dermatologie pro praxi se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete na jeho konci. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Opary lze efektivně léčit:

- a) jen lokálními přípravky
- b) působením UV záření
- c) lokálními přípravky a doplňky stravy, které zvyšují imunitu organismu
- d) jen stimulací imunity organismu

2 Kuří oka vznikají jako následek:

- a) bakteriální infekce
- b) virové infekce
- c) chemického poškození kůže
- d) otlaku v důsledku nevhodné obuvi

3 Kolodium forte obsahuje:

- a) kyselinu salicylovou a kyselinu mléčnou
- b) carvacrol
- c) kyselinu monochloroctovou
- d) hydrokoloidy

4 Moderní metoda léčení křečových žil radiofrekvenční ablací byla Goldmanem poprvé použita:

- a) v roce 1990
- b) v roce 2008
- c) v roce 2000
- d) v roce 2001

5 Moderní metoda radiofrekvenční ablace je určena v případě chirurgie povrchního žilního systému pro léčbu:

- a) pouze vena safena magna (VSM)
- b) pouze vena safena parva (VSP)
- c) lze jí využít v léčení insuficience jak VSM, tak VSP
- d) nehodí se ani pro jednu z uvedených žil

6 Nevhodná k udržovací léčbě akné jsou externa obsahující:

- a) erytromycin
- b) kyselinu azelaovou
- c) retinoly
- d) clindamycin

7 Mastocytózy jsou:

- a) onemocnění charakterizované sníženou funkcí mastocytů
- b) vždy se špatnou prognózou
- c) choroby vyskytující se hlavně v dětském věku
- d) vždy vázány na imunologickou reakci I. typu

8 Urticaria pigmentosa:

- a) se vyskytuje u dětí i dospělých
- b) typický je pozitivní Darierův příznak, plastický dermografismus a pruritus
- c) je spojena s maligním krevním onemocněním
- d) je léčena v první řadě kortikosteroidy

9 Při podezření na onychomykózu odebíráme k mykologickému vyšetření:

- a) odstřížený nehet
- b) libovolné šupinky z povrchu nehtu
- c) šupinky z rozhraní zdravé a postižené oblasti
- d) setřeme bakteriologickou kličkou

10 Pro časné fáze onemocnění Churg Straussově syndromem jsou typické:

- a) recidivující infekce močových cest
- b) migrující záněty povrchních žil
- c) fotosenzitivní exantém v obličeji
- d) alergická rinitida a bronchiální astma

11 Charakteristickým znakem při histologickém vyšetření vzorku tkáně u celé skupiny ANCA pozitivních vaskulitid je:

- a) přítomnost i depozit imunokomplexů
- b) nepřítomnost depozit imunokomplexů
- c) infiltrace tkání eosinofily
- d) nález granulomů

12 Základním lékem pro léčbu systémových forem vaskulitid jsou:

- a) imunosupresiva
- b) antibiotika
- c) glukokortikoidy
- d) antimalarika

Správné odpovědi: 1. c; 2. d; 3. a; 4. a; 5. c; 6. a, d; 7. c; 8. a, b; 9. c; 10. d; 11. a; 12. c