

Další využití imiquimodu v léčebné praxi

Dg.: Basaliom, M. Bowen

MUDr. Lubomír Drlík

Kožní oddělení, Nemocnice Šumperk

Autor popisuje úspěšnou léčbu rozsáhlého tumoru tváře a ucha imiquimodem. Při dlouhodobém sledování je pacient v remisi onemocnění.

Klíčová slova: tumor tváře, imiquimod.

Other uses of imiquimod in practice

The author describes the successful treatment of extensive facial and ear tumor using imiquimod. During the long-term monitoring the patient is in remission.

Key words: facial tumor, imiquimod.

Dermatol. praxi 2010; 4(2): 99–100

Pacient: ročník 1931.

První vyšetření: 1993, prokázán sklerodermiformní bazaliom levé tváře, posléze bazaliom na levém boltci a ve zvukovodu, na levé straně krku. Léčen chirurgicky, v roce 2000 radioterapií – od téhož roku také chirurgická léčba na plastické chirurgii v Brně-Bohunicích.

Léčba imiquimodem: Morbus Bowen na pravém spodním víčku imiquimodem –

5 týdnů s velmi dobrým efektem. Dále nálezy solárních keratóz v nepřehledném terénu po výše uvedených operacích a radioterapii na levé tváři v únoru–dubnu 2007 imiquimodem 3× týdně, přerušeno pro značnou zánětlivou reakci. Po zklidnění byla léčba opakována v průběhu července–srpna 2007 bez komplikací.

Výsledek: Vynikající klinický i kosmetický, dlouho přetrvávající efekt léčby.

MUDr. Lubomír Drlík

Kožní oddělení, Nemocnice Šumperk
Nerudova 41, 787 01 Šumperk
drlik@nemspk.cz



Obrázek 1. Rozsáhlý bazaliom před léčbou



Obrázek 2. Bazaliom v průběhu léčby



Obrázek 3. Bazaliom po léčbě

