

Vážení čtenáři, na stránkách Dermatologie pro praxi se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete na jeho konci. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Nizoral šampon obsahuje účinnou látku:

- a) clotrimazol
- b) bifonazol
- c) ketokonazol
- d) nystatin

2 Canespor krém se aplikuje:

- a) jednou měsíčně
- b) jednou denně
- c) jednou týdně
- d) dvakrát denně

3 Ulcus durum je:

- a) bolestivý
- b) nebolestivý
- c) svědící
- d) měkký

4 Příčinou condylomata lata jsou:

- a) viry
- b) mykobakterie
- c) kvasinky
- d) treponemy

5 Na zánětlivé formy seboroické dermatitidy je vhodný přípravek:

- a) Belogent mast
- b) Imacort krém
- c) Triamcinolon E mast
- d) Triamcinolon S mast

6 Mezi první příznaky anafylaxe patří:

- a) zblednutí, pocení
- b) pruritus
- c) bezvědomí
- d) dráždivý kašel

7 Lékem první volby při rozvoji anafylaxe je:

- a) kortikosteroid i. m.
- b) Syntophyllin i. v.
- c) adrenalin i. m.
- d) infuze fyziologického roztoku

8 Pro keloidní jizvu neplatí:

- a) spontánně regreduje
- b) nepřesahuje hranice původní rány
- c) vyskytuje se častěji u fototypu I
- d) je asociována s krevní skupinou A

9 Pro hypertrofickou jizvu platí:

- a) může spontánně zregredovat
- b) činí svým nositelům kosmetické obtíže
- c) přesahuje hranice původní rány
- d) ke korekci vzhledu jizvy lze využít tekutý dusík

10 Tanorexie znamená:

- a) požívání a následné zvracení potravin tmavé barvy
- b) chorobná touha být stále opálen
- c) anorexie u osob v seniorském věku
- d) chorobný strach před opálením

11 Spinalioma in situ:

- a) je zhoubný nádor kůže s metastázou ve spádové uzlině
- b) je benigní útvar na kůži, který nikdy dále neprogreduje
- c) je aktinická keratóza s možností maligního zvratu
- d) je tenký melanom bez pigmentu

12 Jód při lokální aplikaci:

- a) nemůže vyvolat alergickou reakci
- b) se smí používat u pacientů s onemocněním štítné žlázy
- c) se může hromadit ve štítné žláze a ovlivňovat její činnost
- d) proniká i neporušenou kůží

Správné odpovědi: 1. c; 2. b; 3. b; 4. d; 5. b; 6. a, b, c, d; 7. c; 8. a, b, c; 9. a, b, d; 10. b; 11. c; 12. c, d