

Vážení čtenáři, předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá z 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Správné odpovědi na otázky jsou v souladu s informacemi v příslušných článcích. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 U pacientek s těžkou formou akné před terapeutickou aplikací kombinované hormonální antikoncepce:

- a) stanovujeme hladinu plazmatických androgenů, neboť léčba pomocí antikoncepce bude účinná pouze u pacientek s hyperandrogenemií
- b) stanovujeme hladinu plazmatických androgenů pouze v případech známek hirsutizmu, poruch menstruačního cyklu a akné, případně i cushingoidního vzhledu, akantosis nigricans a zvýšeného libida
- c) hladinu plazmatických androgenů nestanovujeme, neboť u žen s těžkou formou akné ji můžeme vždy předpokládat již z klinického průběhu
- d) hladinu plazmatických androgenů nestanovujeme nikdy, pro léčbu akné není důležitá

2 Kombinovaná hormonální antikoncepce působí příznivě na manifestaci akné níže uvedeným mechanismem:

- a) zvyšuje plazmatickou hladinu sex-hormon binding globulinu (SHBG), který váže testosteron a snižuje tak jeho volnou a biologicky aktivní frakci
- b) snižují ovariální produkci androgenů supresí hypofyzárního luteinizačního hormonu
- c) omezují periferní konverzi testosteronu na 5-dihydrotestosteron inhibicí enzymu 5- α -reduktáza
- d) při vyšší koncentraci specifických antiandrogenních progestinů inhibují buněčné receptory pro testosteron

3 REM je indukována:

- a) stresem
- b) slunečním zářením
- c) bakteriální infekcí
- d) hormonálními změnami

4 V léčbě REM jsou nejvíce efektivní:

- a) aromatické retinoidy
- b) zevní a celkové steroidy
- c) imunomodulátory
- d) antimalarika

5 Histologicky u melazmatu nalézáme:

- a) vyšší počet melanocytů v dermis
- b) vyšší počet melanocytů v epidermis
- c) normální počet melanocytů v epidermis
- d) nižší počet melanocytů v epidermis

6 Melazma v graviditě:

- a) je spojena s intenzivním pruritem
- b) je odrazem vyšší hormonální stimulace u predisponovaných jedinců
- c) je vždy přechodného charakteru a časně po ukončení těhotenství vždy úplně regreduje
- d) postihuje převážně pacientky s fototypem I a II

7 Aplikace biologické léčby adalimumabu (Humiry) se provádí:

- a) 1 $\times$ za 8 týdnů
- b) 1 $\times$ týdně
- c) 2 $\times$ týdně
- d) 1 $\times$ za 14 dnů

8 Predilekční lokalizací akné jsou:

- a) obličej
- b) ramena
- c) třísla
- d) horní partie zad a trupu

9 Nejvhodnější pro léčbu akné v období kojení jsou:

- a) kyselina azelaová
- b) lokální erytromycin
- c) perorální izotretinoin
- d) perorální tetracyklin

10 Traumatický ušní hematoma:

- a) vzniká subperichondriálním krvácením
- b) nutné chirurgické řešení
- c) lze ponechat bez ošetření
- d) není bolestivý

11 Na jaké místo se aplikují epikutánní testy?

- a) na jakékoli místo
- b) pouze na záda
- c) na klinicky zdravou kůži
- d) na očištěnou a oholenou pokožku

12 Popálenina IIb stupně se:

- a) zhojí vždy spontánní epitelizací
- b) vždy musí transplantovat
- c) zhojí pouze pokud jsou zachována kožní adnexa
- d) léčí pouze excizí

Správné odpovědi: 1. b; 2. a, b, c, d; 3. b, d; 4. d; 5. c; 6. b; 7. d; 8. a, b, d; 9. a, b; 10. a, b; 11. c; 12. c